4031142

EF 9
#0080

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
HEMEROTECA
BARRANQUILLA

# *FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESCABIOSIS EN MENORES DE 8 AÑOS, BARRIO LOMAFESCA DE PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO 2003*

*ROCIO REVOLLEDO RODELO*

***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DEL DESARROLLO SIMÓN BOLÍVAR***
***FACULTAD DE ENFERMERIA***
***VIII SEMESTRE***
***BARRANQUILLA***
***2003***

# *FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESCABIOSIS EN MENORES DE 8 AÑOS, BARRIO LOMAFESCA DE PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO 2003*

*ROCIO REVOLLEDO RODELO*

*Asesor:*
***CARLOS ALBERTO ALVAREZ***

***CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DEL DESARROLLO SIMÓN BOLÍVAR***
***FACULTAD DE ENFERMERIA***
***VIII SEMESTRE***
***BARRANQUILLA***
***2003***

***Nota de Aceptación***

_____

_____

_____

_____

***Jurado***

_____

***Jurado***

_____

***Presidente del Jurado***

*Barranquilla, Septiembre 17 de 2003*

UNIVERSIDAD SIMON BOLI
BIBLIOTECA
BARRANQUILLA

No INVENTARIO 4031172

PRECIO

FECHA 01-15-2008

CANJE DONACION

## *AGRADECIMIENTOS*

*A Dios, le doy gracias pro haberme iluminado y darme entendimiento y sabiduría para superar todos los obstáculos que se presentaron para la realización de este proyecto.*

*A mis padres ARMANDO REVOLLEDO y SOL MARINA RODELO, quienes se sacrificaron y me brindaron su apoyo incondicional en todos los momentos que lo necesité.*

*Nuevamente le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a la meta.*

***Rocio Revolledo Rodelo***

## *CONTENIDO*

*Pág.*


*TITULO*
*INTRODUCION* 7
*1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA* 8
*2. JUSTIFICACIÓN* 9
*3. FACTORES DE RIESGOS* 13
*4. OBJETIVOS* 14
*4.1 OBJETIVO GENERAL* 14
*4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS* 14
*5. PROPÓSITO* 16
*6. MARCO TEÓRICO* 17
*6.1 ESCABIOSIS NORUEGA* 18
*6.2 ESCABIOSIS CANINA* 19
*7. DISEÑO METODOLOGICO* 20
*7.1 TIPO DE ESTUDIO* 20
*7.2 UNIVERSO* 20
*7.3 FUENTE DE INFORMACIÓN* 20
*7.4 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN* 20
*7.5 ESTANDARIZACION DEL INSTRUMENTO* 21
*7.6 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN* 21
*7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA* 21
*7.7.1 Población* 21
*7.7.2 Muestra* 22
*8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES* 23
*9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS* 27
*10. CONCLUSIÓN* 38
*11. RECOMENDACIONES* 40
*12. BIBLIOGRAFÍA* 41
*ANEXOS*
*CRONOGRAMA*
*PRESUPUESTO* 43
*ENTREVISTA*

# *FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESCABIOSIS EN MENORES DE 8 AÑOS, BARRIO LOMAFESCA DE PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO 2003*

# *INTRODUCION*

*El presente proyecto de investigación lleva por título "Factores de Riesgo Asociados a escabiosis en menores de 8 años, barrio Lomafesca de puerto Colombia atlántico 2003" ha sido desarrollado con el ánimo de identificar los factores que se asocian a la incidencia de escabiosis en la población objeto de estudio.*

*A sabiendas de que la escabiosis es una enfermedad que se caracteriza pro sus apariencia sencilla, lo que permite que en su etapa inicial pueda ser confundida con infecciones menores, razón por la cual se realiza un estudio descriptivo sobre los factores asociados a la aparición de escabiosis en el barrio Lomafresca, teniendo en cuenta la población infantil, quien es la más afectada en cuanto a esta epidemia.*

*Debido a la gran problemática que afecta a la población en estudio se hizo necesario la elaboración de este trabajo de investigación, para así contribuir en el control de la escabiosis mediante programas educativos acerca del manejo y control de la enfermedad.*

# *1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA*

*¿ CUALES SON LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESCABIOSIS EN MENORES DE 8 AÑOS, BARRIO LOMAFESCA DE PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO 2003?*

## *3. FACTORES DE RIESGOS*

*Entre los factores de riesgos que se asocian a la aparición de la escabiosis encontré:*

- *Aguas estancadas a los alrededores de las viviendas*
- *Convivencia con animales domésticos*
- *Falta de higiene personal*
- *Falta de higiene de la vivienda*
- *Niños a pies descalzos*
- *Mal manejo de la enfermedad y tratamiento*

# *4. OBJETIVOS*

## *4.1 OBJETIVO GENERAL*

*Determinar los factores de riesgos asociadas a la Escabiosis en niños menores de 8 años del barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia - Atlántico en el año 2003.*

## *4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS*

- *Determinar el nivel educativo de los padres*
- *Determinar el grado de conocimiento de los padres de la población objeto de estudio, acerca de la escabiosis*
- *Identificar en que edades y sexo existe escabiosis en la población objeto de estudio*
- *Identificar las diferentes medidas higiénicas que poseen las familias para con el cuidado personal y de la vivienda.*
- *Establecer el tipo de servicio de salud utilizado por la población objeto de estudio.*

- *Determinar la cantidad y clase de animales domésticos por viviendas en la población objeto de estudio.*
- *Determinar el abastecimiento de agua en la población objeto de estudio*
- *Determinar la recurrencia dela enfermedad en la población objeto de estudio.*
- *Identificar el tipo de Seguridad Social en salud que poseen en la población objeto de estudio.*
- *Determinar el estrato económico de la población en estudio*

## *5. PROPÓSITO*

*Aportar a la comunidad del Barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia Atlántico, estrategias claras, oportunas y precisas que permitan disminuir la incidencia de la escabiosis en este sector y a través de estos lograr el mejoramiento socio ambiental, cultural en las familias del barrio Lomafresca y controlar los factores de riesgo que se asocian a la presencia de la escabiosis en los niños del barrio.*

## *6. MARCO TEÓRICO*

*La escabiosis o vulgarmente llamada "sarna" es causa por el ácaro sarcoptes scabiei var haminis, es una epidemia paciente que ha dado lugar a un aumento de la incidencia de la enfermedad en todos los grupos de edad, en especial en la población infantil menor de 8 años.*

*Ésta consiste en una erupción intensamente pruriginosa basada en ronchas, pápulas, vesículas, túneles filiformes, y una dermatitis eczematosa sobreimpuesta.*

*La escabiosis se trasmite mediante contacto directo con personas infectadas, está constituida por nódulos de color marrón, las zonas preferidas son los espacios interdigitales, muñecas, codos, tobillo, glúteos, ombligo, genitales, areolas y axilas, la cara y cuero cabelludo, a menudo suelen estar afectados. Todas estas lesiones son extremadamente pruriginosa sobre todo por las noche, el prurito produce eczematización, escoriación y piodermitis secundaria que pueden enmascarar la verdadera naturaleza del proceso.*

*El ácaro hembra adulto mide aproximadamente 0.4mm de longitud y tiene 4 pares de patas y un cuerpo hemisférico marcado por arrugas y espinas con cerdas marrones sobre la superficie dorsal, el ácaro macho mide aproximadamente la mitad y es similar en su configuración. Tras la fertilización sobre la superficie cutánea la hembra grávida forma un túnel en estrato córneo y lo extiende gradualmente a medida que deposita uno a 3 huevos ovales diariamente y numerosos gránulos fecales marrones. Una vez complementado el depósito de huevos en cuatro o cinco semanas la hembra muere en el túnel, los huevos se incuban durante tres o cinco días, dando lugar a larvas que crecen y se convierten en ninfas sobre la superficie cutánea. La madurez se consigue en unas dos o tres semanas tras el apareamiento la hembra grávida invade la piel para completar su ciclo vital.*

*Existen dos tipos de escabiosis noruega y escabiosis canina.*

## *6.1 ESCABIOSIS NORUEGA*

*Es una variante de la escabiosis humana es altamente contagiosa, y ocurre fundamentalmente en instituciones entre pacientes debilitados mentalmente y físicamente. Los individuos afectados son infestados por*

*millares de ácaros que viven en las costras y escamas, exfoliativas de las lesiones cutáneas y del cuero cabelludo. En esta forma de la enfermedad las uñas pueden hacerse gruesas, distróficas y densamente pobladas por ácaro. El tratamiento es difícil requiere de medidas de aislamiento y aplicaciones repetidas, pero cuidadosa , de preparados escabiosidas.*

## *6.2 ESCABIOSIS CANINA*

*Ésta es causada por el sacoptes scabiei varcanis, el ácaro del perro y se asocia con la roña, esto se adquiere la mayoría de las veces al acariciar un cachorro infectado.*

*Tiene las mismas manifestaciones clínicas con la diferencia que en ésta no existen túneles, ya que el ácaro raramente habita en el estrato córneo humano, la erupción tiene predilección por los brazos, tórax y abdomen, las zonas habituales del contacto*[4].

[4] www.tupediatra.com/tema/tema/55htm

# *7. DISEÑO METODOLOGICO*

## *7.1 TIPO DE ESTUDIO*

*El tipo de estudio en el presente proyecto es descriptivo.*

## *7.2 UNIVERSO*

*La investigación se efectuó en el barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia con 150 niños menores de 8 años infectados con escabiosis.*

## *7.3 FUENTE DE INFORMACIÓN*

*La información fue recolectada a través de los habitantes del barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia-Atlántico.*

## *7.4 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN*

*Las técnicas empleadas para la recolección y análisis de datos fueron:*

- *Visitas domiciliarias: Las cuales permitieron efectuar diálogos e intercambios de conocimientos con los habitantes del sector*

- *Encuestas y entrevistas: Las cuales confirmaron con exactitud los factores que se asocian a la epidemia de escabiosis en los niños menores de 8 años en el barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia.*

## *7.5 ESTANDARIZACION DEL INSTRUMENTO*

*La población retomada que constituye la investigación fueron los niños menores de 8 años de la comunidad de Lomafresca del municipio de Puerto Colombia – Atlántico.*

## *7.6 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN*

*La información será presentada a través de gráficos, barras de frecuencias y barras simples para cada una de las variables.*

## *7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA*

### *7.7.1 Población*

*La población en estudio son 150 niños menores de 8 años habitantes del barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia.*

- *Encuestas y entrevistas: Las cuales confirmaron con exactitud los factores que se asocian a la epidemia de escabiosis en los niños menores de 8 años en el barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia.*

## *7.5 ESTANDARIZACION DEL INSTRUMENTO*

*La población retomada que constituye la investigación fueron los niños menores de 8 años de la comunidad de Lomafresca del municipio de Puerto Colombia – Atlántico.*

## *7.6 PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN*

*La información será presentada a través de gráficos, barras de frecuencias y barras simples para cada una de las variables.*

## *7.7 POBLACIÓN Y MUESTRA*

### *7.7.1 Población*

*La población en estudio son 150 niños menores de 8 años habitantes del barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia.*

### *7.7.2 Muestra*

$$N = \frac{(Za\ ½)^2\ P.\ Q\ U.}{N.\ (E^2) + (Za\ ½)\ P.Q.}$$

$$N = \frac{(1.96)^2\ (0.05)^2\ (0.95)\ (150)}{150\ (0.05)^2 + (\ 1.96)^2\ (0.05)\ (0.95)}$$

$$N = \frac{27.3714}{0.557976}$$

$$N = 49.054 \sim 50$$

## *8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES*

| *MACROVARIABLES* | *VARIABLE* | *DEFINICIÓN* | *CRITERIO DE CLASIFICACION* | *NATURALEZA* | *MEDICION* |
|---|---|---|---|---|---|
| *Característica social* | *Grado de escolaridad de los padres* | *Estudios realizados en un período de tiempo* | *Analfabeta*<br>*Primaria*<br>*Secundaria*<br>*Técnico*<br>*Universitario* | *Cualitativa* | *Nominal* |
| | *Grado de conocimiento acerca de la escabiosis* | *Nivel de conocimiento que tienen los padres acerca de la enfermedad* | *Si*<br>*No* | *Cualitativa* | *Nominal* |
| | *Seguridad social* | *Entidad de salud que posee la persona* | *Ninguno*<br>*SISBEN*<br>*EPS*<br>*IPS*<br>*Otros* | *Cualitativa* | *Nominal* |
| | *Estrato económico* | *Nivel económico en que se encuentra la familia* | *Uno*<br>*Dos*<br>*Tres*<br>*Cuatro*<br>*Cinco*<br>*Seis* | *Cuantitativo* | *Razón* |
| *Características demográficas* | *Sexo* | *Género o características* | *Femenino*<br>*Masculino* | *Cualitativa* | *Nominal* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | *orgánica que diferencia el hombre de la mujer* | | | |
| | *Edad* | *Número de años que ha cumplido una persona* | *0 – 1*<br>*1 – 2*<br>*2- 3*<br>*3-4*<br>*etc.* | *Cuantitativa* | *Intervalo* |
| | *Abastecimiento de agua* | *Lugar donde proviene el agua para el consumo y necesidades de la vivienda* | *Acueducto*<br>*Alberca*<br>*Pozo*<br>*Laguna* | *Cualitativa* | *Nominal* |
| | *No. de animales doméstico y clase* | *Número de animales que existen en el hogar* | *Perros 1,2,3 etc.*<br>*Gatos 1,2,3, etc.*<br>*Gallinas 1,2,3, etc*<br>*Burros,1,2,3, etc.*<br>*Otros* | *Cuantitativo* | *Razón* |
| | *Recurrencia de la enfermedad* | *Número de veces que se padece una enfermedad* | *De 1 – 2 veces*<br>*De 2 – 3 veces*<br>*De 3 – 4 etc.* | *Cuantitativa* | *Intervalo* |

## *9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS*

***Tabla No. 1:*** *Nivel educativo de los padres*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Ninguno (N)* | *25* | *25%* |
| *Primaria (P)* | *40* | *40%* |
| *Secundaria (S)* | *17* | *17%* |
| *Técnico (T)* | *10* | *10%* |
| *U.Tario (U)* | *8* | *8%* |
| ***TOTAL*** | *100* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 1***




***Interpretación:***

*Un 40% de los padres de familia tuvieron una educación primaria, el 25% no ingresó a ningún plantel educativo, el 17% cursó algún grado de secundaria, el 10% cursó alguna carrera técnica, el 8% restante tuvieron una carrera universitaria*

***Tabla No.2:*** *Grado de conocimiento acerca de la escabiosis*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Ninguno (N)* | *30* | *60%* |
| *Que es (Q)* | *10* | *40%* |
| *Las causas ©* | *0* | *0%* |
| *T. Tratamiento (T)* | *0* | *0%* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 2***




***Interpretación:*** *El 60% no tienen conocimiento de la enfermedad, el 40% restante posee un mínimo conocimiento.*

***Tabla No. 3:*** *Seguridad Social en Salud que poseen.*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Ninguno (N)* | *15* | *30%* |
| *Sisben (S)* | *30* | *60%* |
| *EPS (E)* | *5* | *10%* |
| *IPS (S)* | *0* | *0%* |
| *Otros (O)* | *0* | *0%* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 3***




***Interpretación:*** *El 60% cuenta con Sisben, 30% no tienen seguridad social, el 10% cuentan con EPS.*

***Tabla No. 4:*** *Estrato económico*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Estrato 1* | *25* | *50%* |
| *Estrado 2* | *25* | *50%* |
| *Estrato 3* | *0* | *0%* |
| *Estrato 4* | *0* | *0%* |
| *Estrato 5* | *0* | *0%* |
| *Estrato 6* | *0* | *0* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 4***




***Interpretación:*** *En este caso se divide el 50% en el estrato 1 y el otro 50% en el estrato 2.*

***Tabla No. 5:*** *Distribución de la frecuencia en el sexo que es predisponente en la escabiosis.*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Femenino* | *65* | *43%* |
| *Masculino* | *85* | *56%* |
| ***TOTAL*** | *150* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 5***




***Interpretación:*** *En un 56% es más frecuente apreciar escabiosis en niños que en niñas, en donde hay una prevalencia del 43%*

***Tabla No. 6:*** *Distribución de las frecuencias de la edad que es predisponente en la escabiosis*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *0-1* | *9* | *6%* |
| *1-2* | *20* | *13.3%* |
| *2-3* | *23* | *15.3%* |
| *3-4* | *10* | *6.60%* |
| *4-5* | *18* | *12%* |
| *5-6* | *30* | *20%* |
| *6-7* | *15* | *10%* |
| *7-8* | *25* | *16.20%* |
| ***TOTAL*** | *150* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*




***Interpretación:*** *El mayor índice se encuentra en las edades de 5 a 6 años, con un 20%, de 7 – 8 años con un 16.2%, de 2-3 años con un 15.3%, de 1-2 años 13.3%, de 4-5 años 12%, de 6-7 años 10%, de 3-4 con un 6.6%, de 0-1 año con un 6%.*

***Tabla No. 7:*** *distribución de la frecuencia de abastecimiento de agua en las familias.*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Acueducto (AC)* | *25* | *50%* |
| *Alberca (AB)* | *25* | *50%* |
| *Pozo (P)* | *0* | *0%* |
| *Laguna (L)* | *0* | *0%* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No.7***




***Interpretación:*** *Aquí se observa que el abastecimiento de agua es solo de dos formas, el 50% acueducto y el 50% restante alberca.*

***Tabla No. 8:*** *Distribución de la frecuencia de animales domésticos.*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *Perro 1,2,3* | *30* | *37.5%* |
| *Gatos 1,2,3* | *2* | *2.5%* |
| *Gallina 1,2,3* | *25* | *32.5%* |
| *Burros 1,2,3* | *20* | *2.5%* |
| *Otros (O)* | *3* | *3.75%* |
| ***TOTAL*** | *80* | *100* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 8***




***Interpretación:*** *En la convivencia con animales domésticos el mayor índice lo obtuvieron los perros con un 37.5%, el 31.5% las gallinas, el 25% los burros, el 3.75% otros animales domésticos y el 25% los gato.*

***Tabla No.9:*** *Distribución de la frecuencia de higiene personal*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *SI* | *12* | *24%* |
| *NO* | *38* | *76%* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 9***




***Interpretación:*** *Solo el 24% tienen una buena higiene personal, el 76% posee un regular estado de higiene personal.*

***Tabla No. 10:*** *Distribución de la frecuencia e higiene de la vivienda.*

| ***Variable*** | ***Frecuencia*** | ***%*** |
|---|---|---|
| *SI* | *20* | *40%* |
| *NO* | *30* | *60%* |
| ***TOTAL*** | *50* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 10***




***Interpretación:*** *Solo el 40% tienen una buena higiene de la vivienda, el 60% restante posee un regular estado de higiene en la vivienda.*

***Tabla No. 11:*** *Distribución de la frecuencia recurrencia dela enfermedad.*

| *Variable* | *Frecuencia* | *%* |
|---|---|---|
| *1-2* | *30* | *20%* |
| *2-3* | *56* | *37.3%* |
| *3-4* | *23* | *15.3%* |
| *4-5* | *27* | *18%* |
| *5-6* | *14* | *9.3%* |
| ***TOTAL*** | *150* | *100%* |

***Fuente:*** *Encuesta realizada a los padres*

***Gráfica No. 11.***




***Interpretación:*** *El mayor índice de recurrencia se encuentra de 2-3 veces con un porcentaje de 37.3%, el 20% de 1-2 veces, el 18% de 4-5 veces, el 15.3% de 3-4 veces, el 9.3% de 6 –6 veces.*

## *10. CONCLUSIÓN*

*Siendo la escabiosis una enfermedad causada por ácaros y que alter ala integridad de la piel progresivamente causada por el contacto directo de los diferentes factores de riesgos encontrados en el barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia y por ende en las familias de la misma he llegado a la siguiente conclusión.*

*La escabiosis encuentra en el barrio Lomafresca del municipio de Puerto Colombia los factores condicionantes propios para el desarrollo como lo son:*

- *Aguas negras o estancadas a los alrededores de las viviendas*
- *Falta de higiene en las viviendas*
- *Falta de higiene personal*
- *Convivencia con animales domésticos*
- *Y no acudir oportunamente al médico para el tratamiento eficaz de la enfermedad.*

*Los padres no tienen conocimiento suficiente acerca de los factores que se asocian a al escabiosis y por esto no toman medidas adecuadas para que sus hijos no tengan contacto con estos focos infecciosos. Los niños*

*permanecen descalzos, manipulas aguas estancadas, y que no cuentan con las mejores condiciones higiénicas. Todo esto es atribuido al bajo nivel de escolaridad, socio económico y socio cultural que presenta esta población.*

*Durante intercambio de conocimientos que hace con las familias del sector, pude notar la preocupación que les aqueja ahora que tienen un poco de conocimiento de la enfermedad.*

*En base a lo dicho anteriormente surgen las siguientes recomendaciones: Que a través de su ejecución espero sea disminuido el índice de escabiosis en la población estudio.*

## *11. RECOMENDACIONES*

- *Realizar un plan educativo acerca de la escabiosis con los padres de familia del Barrio Lomafresca, con el fin de que conozcan la forma de prevenir y controlar la enfermedad.*
- *Dar a conocer a los padres de familia a través de programas de promoción y prevención de la enfermedad los diversos factores de riesgos que se asocian a la escabiosis existentes en la población y de esta manera disminuir el índice de escabiosis que se está presentando en la comunidad.*
- *Después del tratamiento se recomienda lavar la ropa, toallas, ropa interior con agua caliente y luego colocarla al sol.*
- *Se recomienda el tratamiento preventivo de todos los miembros del grupo familiar de forma simultánea para prevenir la infección.*
- *Enseñar cuidados veterinarios a las personas que conviven con animales domésticos.*

## *12. BIBLIOGRAFÍA*


*Tratado de Pediatría Nelson. Editorial Interamericana Vol.1 México, D.F. 1988 16 edición.*

*Atlas de dermatología clínica. Editorial Mc Graw Hill Interamericana. Tercera edición.*

*Diccionario de salud infantil. Editorial Grijalbo*

*www.tupediatra.com/temas/temas.55htm*

*www.sarna.con/5k-14sept2003*
*www.neveron.com.sarna.net.baffle.tech.archivin.now.archivin 3747*

*www.aadorg/panphklets.spanish/sarna.htm*

*www.embarazada.con/bebeooge,asp*

*www.dane..gov.com*

# *ANEXOS*

## *CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN*
### *2003*

| *ACTIVIDADES* | *Feb* | *Marz* | *Abr* | *May* | *Jun* | *Jul* | *Agost* | *Sept* | *Octu* | *Nov* | *Dic* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Selección del tema* | | | | | | | | | | | |
| *Someter el tema para su escogencia por el comité de investigación* | | | | | | | | | | | |
| *Aceptación del tema* | | | | | | | | | | | |
| *Observación de la comunidad* | | | | | | | | | | | |
| *Iniciación de la investigación* | | | | | | | | | | | |
| *Asesoría por el profesor Carlos Álvarez* | | | | | | | | | | | |
| *Entrega del trabajo hasta el aspecto metodológico* | | | | | | | | | | | |
| *Aceptación del anteproyecto* | | | | | | | | | | | |
| *Asesorías Metodológicas* | | | | | | | | | | | |
| *Asesorías de contenido* | | | | | | | | | | | |
| *Desarrollo de encuestas* | | | | | | | | | | | |
| *Desarrollo de trabajo* | | | | | | | | | | | |

## *PRESUPUESTO*

| ***Detalles*** | |
|---|---|
| *Transporte* | *150.000* |
| *Papelería* | *50.000* |
| *Investigaciones* | *50.000* |
| *Fotocopias* | *40.000* |
| *Encuestas* | *80.000* |
| *Refrigerios* | *60.000* |
| ***TOTAL*** | ***$430.000*** |

***INSTRUMENTO DE REDACCIÓN DE LA INFORMACIÓN***

***FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A ESCABIOSIS EN MENORES DE 8 AÑOS, BARRIO LOMAFESCA DE PUERTO COLOMBIA ATLÁNTICO***
***2003***

*FECHA :* _____

*FAMILIA:* _____

*DIRECCIÓN:* _____

*1. Que nivel de escolaridad tiene usted*

*a) primaria*

*b) secundaria*

*c) universitario*

*d) ninguno*

*2. De ha enfermado algún miembro de la familia con escabiosis*

*Si:* ____ *No* _:___

*A que edad* ____

*3. Sabe usted cual fue la causa?* _____

*4. Cuando sus niños se enferman de escabiosis a donde los lleva o los llevaría.*

*a) Ningún lado*

*b) A la vecina*

*c) Al puesto de salud*

*d) Al hospital*

*e) Farmacia del pueblo*

*f) Otros Cuáles?.*_____

*5. Qué tipo de medicamentos utilizaría?*

*a) Médico*

*b) Naturista*

*c) Otros Cuál?* _____

*6. Conoce usted cuales son las consecuencias que puede producir en un niño el mal cuidado de la escabiosis.*

*Si :* ___

*No:* ___ *Cuáles?* _____

*7. Sabe usted como se trata la escabiosis en el hogar?*

*Si* ____ *No* _____

*8. A qué tipo de entidad social pertenece*

*a) Ninguna*

*b) Sisben*

*c) Eps*

*d) Ips*

*e) Otros Cuáles? _____*

*9. A que estrato económico pertenece*

*a) 1*

*b) 2*

*c) 3*

*d) 4*

*e) 5*

*f) 6*

*10. Cuántos hijos menores de ocho años tiene?*

*Niños ___*

*Niñas ___*

*Total ___*

*11. El agua que consume y utiliza para lavar los alimentos la obtiene de:*

*a) Carrotanques*

*b) Pozo*

*c) Alberca*

*d) Acueducto*

*e) Otros Cuál? _____*

*12. Que clase de tratamiento les brinda usted al agua para el consumo*

*a) Hierve*

*b) Clorifica*

*c) Cruda*

*d) Otros Cuáles? _____*

*13. Cuántos animales hay en la casa?*

*a) Gatos*

*b) Perros*

*c) Burros*

*d) Aves*

*e) Otros Cuáles? _____*

*14. Higiene personal de la familia*

*a) Buena*

*b) Regular*

*c) Mala*

*15. Higiene de la vivienda*

*a) Buena*

*b) Regular*

*c) Mala*

*16. Cuántas veces el niño se ha enfermado con escabiosis*

*a) 1*

*b) 2*

*c) 3*

*d) 4*

*e) 5*

*f) Más de cinco* _____

1- SARNA
2- ESCABIOSIS
3- NIÑOS - SARNA
4- PIEL - ENFERMEDADES
5- DERMATOLOGIA
BARRIO LOMA FRESCA - NIÑOS - SARNA
PUERTO COLOMBIA - BARRIO LOMA FRESCA - SARNA