

DISEÑO Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL TRASTORNO DE PERSONALIDAD LÍMITE EN PACIENTES FARMACODEPENDIENTES ENTRE LOS 18 A 45 AÑOS EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA EN EL AÑO 2019-2020.

Stefanny Paola Acosta Cárdenas
Juan David Molina De La Cruz
Yulitza Paola Molina Rivera

Tutor

Jimmy Larios Rosania

Resumen

El objetivo de este estudio es diseñar un instrumento que permita la identificación de trastorno límite de la personalidad en pacientes fármaco dependientes. Este es un estudio descriptivo analítico de corte transversal en el cual se realizó la aplicación de un instrumento tipo encuesta para tamizaje de identificación de trastorno de personalidad limite a una población de pacientes farmacodependientes en el centro de salud mental en barranquilla, en donde se aplicó la prueba piloto de este instrumento al 20% de la población muestra, lo cual se analizó mediante la prueba de coeficiente Alfa de Crombach y matriz de captura de datos tipo Excel para capturas de variables, obteniendo una confiabilidad del 80%.

Palabras claves: Trastorno de personalidad limite, instrumento de tamizaje, farmacodependientes.

Abstract

The objective of this study is to design an instrument that allows the identification of borderline personality disorder in drug dependent patients. This is a descriptive analytical cross-sectional study in which the application of a survey-type instrument for screening for personality disorder identification was carried out to limit a population of drug-dependent patients in the mental

health center in Barranquilla, where the Pilot test of this instrument to 20% of the sample population, which was analyzed by means of the Crombach Alpha coefficient test and an Excel data capture matrix for variable captures, obtaining a reliability of 80%.

Key words: Borderline personality disorder, screening instrument, drug dependents.

Referencias bibliográficas.

1. Reinoso L. Asociación entre los rasgos de trastorno limítrofe de la personalidad y la dependencia a sustancias psicoactiva [En línea]; 2017 [citado 2019 Marzo 23]. Disponible en: <https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/UCSM/6242/70.2228.M.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
2. Gonzalez Florian, D., & Silva Paéz, C. (2019). Factores psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios en bogotá. Disponible en: <http://biblioteca.usbbog.edu.co:8080/Biblioteca/BDigital/65449.pdf>.
3. Thorsten K, Jutta S, Felix B. Borderline personality disorder and comorbid addiction epidemiology and treatment. Deutsches Ärzteblatt International. 2014; 111(16): p. 280-286.
4. Treece C, Nicholson B. DSM III personality type and dose in methadone maintenance patients. The journal of nervous and mental disease. 1990;(168): p. 621- 628.
5. Rousanville BJ. Untreated opiate addicts. Archives of General Psychiatry. 1985; 42: p. 1072- 1077.