

## COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN ESCOLARIZADOS DEL MUNICIPIO DE CAMPO DE LA CRUZ 2019.

Nereya Figueroa Solano

Laura Acevedo Orozco

Ana Castiblanco Tovar

Angie Cortes Sanjuanelo

### Tutor

Nereya Figueroa Solano

### RESUMEN

La Organización Mundial de la Salud, define el alcohol, como una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, la cual se ha utilizado ampliamente en muchas culturas durante siglos. “El consumo nocivo de alcohol conlleva una pesada carga social y económica para las sociedades. El alcohol afecta a las personas y las sociedades de diferentes maneras, y sus efectos están determinados por el volumen de alcohol consumido”.

**Objetivo:** Describir la prevalencia del consumo de alcohol, su relación con los factores de riesgo y el nivel de responsabilidad en escolarizados mayores de 10 años en una Institución Educativa, Municipio de Campo De La Cruz, Atlántico.

**Métodos:** Estudio descriptivo transversal, que se realizó en Escolarizados mayores de 10 años en una Institución Educativa del Municipio de Campo De La Cruz, con el fin de evaluar variables sociodemográficas, consumo de alcohol y responsabilidad mediante la aplicación de los test de AUDIT y CAGE. Los datos obtenidos se tabularon y analizaron por medio de programas estadísticos.

**Resultados:** El 56% de los participantes del estudio, hacen parte de la población femenina. El rango de edad que más consumió de 15-19 años; La clasificación correspondiente a presentación de riesgo alto que requiere derivación al especialista, evidenció que los hombres (1.5%) presentan mayor riesgo frente a

las mujeres con una relación (2:1), En cuanto al consumo perjudicial las mujeres presentan una relación 3:1 frente a los hombres

**Conclusiones:** Queda constatada la necesidad de fortalecer los controles a la oferta orientada al consumo de bebidas alcohólicas, ya que la información recolectada permite observar que el 100% de estos jóvenes han declarado haber consumido alcohol alguna vez en su vida, aunque su venta esté prohibida a menores de edad.

**Palabras Clave:** Consumo de alcohol, adolescentes, prevalencia, responsabilidad, factores de riesgo.

---

## ABSTRACT

The World Health Organization defines alcohol as a psychoactive with dependent properties which have been used in many cultures over the years. "harmful consumption of alcohol implies a strong social and economic burden for societies. Alcohol affects people and societies in different ways. Moreover, its effects are determined according to the percentage of consumed alcohol.

**Objective:** To describe the prevalence of alcohol consumption it's connection with risk factors and the responsibility level of people with more than ten years in the Colegio Nacional Bachillerato del Municipio de Campo De La Cruz, in the department of the Atlantic.

**Methods:** A cross-sectional descriptive study was carried out in schools over 10 years of age in an educational institution in the municipality of Campo De La Cruz in order to evaluate socio-demographic variables, alcohol consumption and liability by applying the AUDIT and CAGE tests. The data obtained were tabulated and analysed through statistical programmes.

**Results:** 56% of the study participants are part of the female population. The age range that consumed most of 15-19 years; The classification corresponding to high risk presentation that requires referral to the specialist, showed that men (1.5%) present higher risk compared to women with a relationship (2:1), Regarding harmful consumption women present

**Conclusions:** There is a need to tighten controls on the supply of alcoholic beverages, since the information collected shows that 100% of these young people have claimed to have consumed alcohol at some time in their lives, even if their sale is prohibited to minors.

**Key words:** Alcohol Consumption, Teenagers, Prevalence, Responsibility, Risk Factors.

## BIBLIOGRAFIA

1. Global status report on alcohol and health 2018 [Internet]. Apps.who.int. 2018 [cited 2 April 2019]. Available from: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1>
2. OMS. Informe de situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas. [Internet]. [Cited 2 April 2019]. Available from: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/alcohol-Informe-salud-americas-2015.pdf>
- 3.(2019). ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACION ESCOLAR COLOMBIA – 2016. [online] Available at:<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estudio-consumo-escolares-2016.pdf>[Accessed 1 Apr. 2019].
- 4.Minsalud.gov.co. (2013). ESTRATEGIA NACIONAL DE RESPUESTA INTEGRAL FRENTE AL CONSUMO DE ALCOHOL EN COLOMBIA. Recuperado de: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENT/estrategia-nacional-alcohol-colombia.pdf> [Accessed 2 MAY 2019].
- 5.Apps.who.int. (2008). INTERNATIONAL GUIDE FOR MONITORING ALCOHOL CONSUMPTION AND RELATED HARM. [online] Available at: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66529/WHO\\_MSD\\_MSB\\_00.4.pdf?sequence=1](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66529/WHO_MSD_MSB_00.4.pdf?sequence=1) [Accessed 2 May 2019].
- 6.Minsalud.gov.co. (2007). ENCUESTA NACIONAL DE SALUD ENS 2007. [online] Available at: <https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/ENCUESTA%20NACIONAL.pdf> [Accessed 2 May 2019].
- 7.Who.int. (2011). Informaciones clínicas básicas para la identificación y el manejo de riesgos y problemas. [online] Available at: [https://www.who.int/substance\\_abuse/publications/alcohol\\_atencion\\_primaria.pdf](https://www.who.int/substance_abuse/publications/alcohol_atencion_primaria.pdf) [Accessed 2 May 2019].
- 8.Organización Mundial de la Salud. (2019). Desarrollo en la adolescencia. [online] Available at: [https://www.who.int/maternal\\_child\\_adolescent/topics/adolescence/dev/es/](https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/) [Accessed 2 may. 2019].



9.Who.int. (2018). El consumo nocivo de alcohol mata a más de 3 millones de personas al año, en su mayoría hombres. [online] Available at: <https://www.who.int/es/news-room/detail/21-09-2018-harmful-use-of-alcohol-kills-more-than-3-million-people-each-year--most-of-them-men> [Accessed 2 May 2019].

10. ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACIÓN ESCOLAR COLOMBIA - 2016 [Internet]. Unodc.org. 2016 [cited 2 June 2020]. Available from: [https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Junio/CO03142016\\_estudio\\_consumo\\_escolares\\_2016.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/2018/Junio/CO03142016_estudio_consumo_escolares_2016.pdf)

11. PLAN NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN, Y LA ATENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2014 – 2021 [Internet]. Minsalud.gov.co. 2017 [cited 2 June 2020]. Available from: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-nacional-consumo-alcohol-2014-2021.pdf>

12. Pérez Gómez A, Scopetta O. Consumo de alcohol en menores de 18 años en Colombia: 2008 un estudio con jóvenes escolarizados de 12 a 17 años en 7 capitales de departamento y dos municipios pequeños [Internet]. Odc.gov.co. 2008 [cited 30 May 2020]. Available from: <http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/consumo/estudios/locales/CO031052008-consumo-alcohol-menores-de-18-anos-colombia-2008.pdf>

13. ESTUDIO NACIONAL DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN POBLACION ESCOLAR COLOMBIA - 2011 [Internet]. Unodc.org. 2011 [cited 30 May 2020]. Available from: [https://www.unodc.org/documents/colombia/DocumentosTecnicos/Estudio\\_Consumo\\_Escolares.pdf](https://www.unodc.org/documents/colombia/DocumentosTecnicos/Estudio_Consumo_Escolares.pdf)

14. Hingson RW, Heeren T, Winter MR. Age at drinking onset and alcohol dependence: age at onset, duration, and severity. Arch Pediatr Adolesc Med. 2006;160(7):739-746. doi:10.1001/archpedi.160.7.739